


# greenarea Heimertingen GmbH

## Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Plesser Ried“

### Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)

Auftraggeber: greenarea Heimertingen GmbH  
Alpenstraße 10  
D – 87751 Heimertingen

Auftragnehmer: M.Sc. (FH) Daniel Honold  
Büro für Faunistik & Artenschutz  
Am Anger 4  
D – 87549 Rettenberg



### **Auftraggeber**

greenarea Heimertingen GmbH  
Alpenstraße 10  
D – 87751 Heimertingen

### **Auftragnehmer und Bearbeiter**

M. Sc. (FH) Daniel Honold  
Büro für Faunistik & Artenschutz  
Am Anger 4  
D – 87549 Rettenberg

T +49 8327 2330465

M +49 170 1798702

M [daniel.honold@gmx.de](mailto:daniel.honold@gmx.de)

### **Quellennachweis Deckblatt**

Übersicht über die Lage des Vorhabengebietes im Plesser Ried, Landkreis Unterallgäu

Quelle: Geodaten © Bayerische Vermessungsverwaltung - [www.geodaten.bayern.de](http://www.geodaten.bayern.de), CC BY 4.0

### **Stand der Fassung**

18.10.2023

## Inhaltsverzeichnis

<b>I</b>	<b>Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1</b>	<b>Anlass und Aufgabenstellung.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2</b>	<b>Datengrundlagen .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3</b>	<b>Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen.....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Wirkungen des Vorhabens .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3</b>	<b>Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>Maßnahmen zur Vermeidung .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG) .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten .....</b>	<b>9</b>
<b>4.1</b>	<b>Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie .....</b>	<b>9</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie.....</b>	<b>9</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie.....</b>	<b>10</b>
<b>4.2</b>	<b>Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie .....</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Gutachterliches Fazit.....</b>	<b>24</b>
	<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>25</b>
	<b>Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums.....</b>	<b>26</b>
<b>A</b>	<b>Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.....</b>	<b>28</b>
<b>B</b>	<b>Vögel .....</b>	<b>31</b>

## **I Tabellenverzeichnis**

Tab. 1: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum potenziell vorkommenden oder nachgewiesenen Säugetierarten. ....	11
Tab. 2: Schutzstatus, Gefährdung und Status der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell vorkommenden saP-relevanten Europäischen Vogelarten, für die eine projektspezifische Wirkung vorliegt. ....	19

## 1 Einleitung

### 1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die greenarea Heimertingen GmbH mit Sitz in Heimertingen im Landkreis Unterallgäu plant im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die Errichtung einer etwa 24 ha großen Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-Freiflächenanlage) im Plesser Ried zwischen Pleß und Winterrieden im Landkreis Unterallgäu.

Im Rahmen der Zulassung und Ausführung des Vorhabens sind im Vorfeld die Auswirkungen auf europarechtlich geschützte und auf national gleichgestellte Arten zu prüfen. Im Zuge der Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde das Büro Daniel Honold im Frühjahr 2023 mit faunistischen Erhebungen im Umgriff des Vorhabengebietes beauftragt. Ziel der Erfassungen war die vorhabenbedingte Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums sowie die Erhebung der Bestandssituation der relevanten Arten als Basis für die saP.

In der vorliegenden saP werden:

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (europäische Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben eintreten können, ermittelt und dargestellt. (*Hinweis zu „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.*)
- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.

### 1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

- Kartierergebnisse zum geplanten Vorhaben: BÜRO HONOLD (2023): Faunistischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Plesser Ried“
- Artenschutzkartierung ASK (Stand der Daten: 07/2023)
- Bayerische Biotopkartierung (Stand der Daten: 2023)
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Landkreis Unterallgäu (BAY. STLEUF 1999)
- BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT: Arteninformationen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung<sup>1</sup>
- Aktuelle Luftbilder

<sup>1</sup> <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/>

### 1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018.

Daneben wurden die Angaben zum Erhaltungszustand der (potenziell) betroffenen, europarechtlich geschützten Arten der Homepage des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELT<sup>2</sup> (Stand der Abfrage: 21.08.2023) entnommen.

Die Abgrenzung und Bewertung der lokalen Population basiert im Allgemeinen auf der Definition der LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (LANA 2009) und für die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden zusätzlich die artspezifischen Hinweise zur Abgrenzung der lokalen Population des BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ (BFN) abgerufen. Bei Arten, deren lokale Population aufgrund großräumiger und flächiger Verbreitung nicht eindeutig abgrenzbar ist, wurde der Landkreis als räumlich niedrigste Ebene verwendet.

Die projektspezifische Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums erfolgte einerseits durch Abschichtung entsprechend den Vorgaben der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern (2013) sowie durch die Erhebung der Bestandssituation der relevanten Arten im Bezugsraum (siehe Anhang „Tabelle zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums“). Die für die Prüfung nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG relevanten Arten wurden im Rahmen der saP auf Betroffenheit geprüft und durch das Vorhaben betroffene geschützte Arten wurden im weiteren Prüfablaufschemata der Prüfung der Beeinträchtigung unterzogen. Diese prüft, ob unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und ggf. vorgezogenen funktionserhaltenden Ausgleichs-(CEF-)Maßnahmen die jeweils einschlägigen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eintreten werden. Die Wirkungen des Vorhabens sowie die Prüfung hinsichtlich des Auslösens von Verbotstatbeständen erfolgte unter Berücksichtigung anerkannter, wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse, Arbeitshilfen und Leitfäden (MKULNV NRW 2013, RUNGE et al. 2010).

<sup>2</sup> <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/>

## **2 Wirkungen des Vorhabens**

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der europarechtlich besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können.

### **2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse**

Baubedingte Wirkfaktoren, die Beeinträchtigungen und Störungen verursachen können, können von Baustraßen, Flächen für die Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Baustellenverkehr und Bautätigkeiten ausgehen. Baubedingt können zudem befristete Wirkungen wie Baufeldfreimachung, Flächenbeanspruchung, Emissionen (Luftschadstoffe, Staub), Lärm und visuelle Störreize einhergehen, die mit dem Bau der PV-Freiflächenanlage verbunden sind.

### **2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse**

Anlagenbedingte Wirkfaktoren, die Beeinträchtigungen und Störungen verursachen können, können durch die Überbauung der Flächen mit Modulen (Flächeninanspruchnahme oder Flächenversiegelung) sowie durch dazugehörige technische Anlagen (Trafostation) einhergehen. Anlagenbedingt kann es durch die Einzäunung des Vorhabengebietes auch zu Barriere- oder Zerschneidungswirkungen für Tierarten kommen. Visuelle Störreize oder Wirkeffekte können zudem durch Lichtreflexionen oder Spiegelungen der Module auf Vogelarten auftreten.

### **2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse**

Betriebsbedingte Wirkfaktoren, die Beeinträchtigungen und Störungen verursachen können, können durch erforderliche Unterhaltungsarbeiten wie Wartungsarbeiten an den Modulen oder den dazugehörigen technischen Anlagen oder Anlagenteilen sowie durch Mäharbeiten im Vorhabengebiet auftreten.

### **3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität**

#### **3.1 Maßnahmen zur Vermeidung**

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

- V1 Bauzeitenregelung Schwarzmilan

Die vorhabenbedingten Baumaßnahmen auf den Flurnummern 2204, 2205, 2220, 2220/2, 2221 Gemarkung Pleß müssen zum Schutz des Schwarzmilans durch baubedingte Störungen tagsüber im Zeitraum von 01. August bis 28./29. Februar, außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen, stattfinden. Die vorhabenbedingten Maßnahmen auf den weiteren, an dieser Stelle nicht aufgeführten Flurnummern des Vorhabenbereichs, müssen ganzjährig tagsüber erfolgen.

- V2 Gebäudeabbruch

Der Abbruch von bestehenden Gebäuden (landwirtschaftliche Stadel) muss zum Schutz von gebäudebrütenden Vogelarten und gebäudebewohnenden Fledermäusen im Zeitraum von 01. November bis 28./29. Februar, außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb der Quartierzeit von Fledermäusen, stattfinden.

#### **3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG)**

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) werden durchgeführt, um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sichern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

- CEF1 Neuschaffung von Spaltenquartieren an Gebäuden als Sommerquartier

Durch das Ausbringen von Fledermauskästen werden potenzielle Quartierverluste an dem Stadel kurzfristig ausgeglichen. Potenziell verloren gegangene Spaltenquartiere müssen im räumlichen Zusammenhang an anderer Stelle (z. B. an benachbarten Stadel) im Vorfeld des Gebäudeabbruchs, spätestens bis März des Folgejahres, installiert werden. Für den Verlust von potenziellen Quartieren an dem abzubrechenden Stadel müssen mindestens fünf Fledermauskästen (z. B. Fa. Schwegler, Fledermausflachkasten 1 FF) an der Ost-, Süd- oder Westseite an der Fassade eines benachbarten Stadels angebracht werden.

## **4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten**

### **4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie**

#### **4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie**

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgendes Verbot:

#### **Schädigungsverbot (siehe Nr. 2 der Formblätter):**

**Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen der besonders geschützten Arten oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Entnehmen, Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.**

**Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn**

- **die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Entnahme-, Beschädigungs- und Zerstörungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 1 BNatSchG analog),**
- **die Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Exemplare oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Standorte im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 2 BNatSchG analog),**
- **die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 3 BNatSchG analog).**

#### **Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Pflanzenarten**

Für den Geltungsbereich liegen keine relevanten Daten in der Artenschutzkartierung bzw. in Karla.Natur vor. Im Vorhabengebiet ist mit keinem Vorkommen von nach Anhang IV b) FFH-RL geschützten Pflanzenarten auszugehen. Dies ist in erster Linie auf die landwirtschaftliche Nutzung des Vorhabengebietes zurückzuführen.

#### 4.1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:

##### **Schädigungsverbot von Lebensstätten** (siehe Nr. 2.1 der Formblätter):

**Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.**

**Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).**

##### **Störungsverbot** (siehe Nr. 2.2 der Formblätter):

**Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.**

**Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).**

##### **Tötungs- und Verletzungsverbot** (siehe Nr. 2.3 der Formblätter):

**Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr.**

**Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,**

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das **Tötungs- und Verletzungsrisiko** für Exemplare der betroffenen Arten **nicht signifikant erhöht** und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);
- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).

#### 4.1.2.1 Säugetiere

##### Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL

Da keine gezielten Erfassungen zu Fledermäusen durchgeführt wurden, wurde die Datenbank der Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ausgewertet. Diese Ergebnisse, in Kombination mit den projektspezifisch und wirkungsempfindlichen Fledermausarten, wurden im Weiteren betrachtet.

Weitere Säugetierarten, die im Anhang IV der FFH-RL genannt sind, kommen im Vorhabengebiet nicht vor, weshalb eine nähere Betrachtung nicht durchgeführt wurde.

**Tab. 1:** Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum potenziell vorkommenden oder nachgewiesenen Säugetierarten.

Erläuterungen zur Tabelle: **RL BY** = Rote Liste Bayern (BAY. LFU 2017), **RL D** = Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2020): \* = ungefährdet, **V** = Vorwarnliste, **R** = extrem selten, **3** = gefährdet, **2** = stark gefährdet, **1** = vom Aussterben bedroht, **0** = ausgestorben oder verschollen, **D** = Daten unzureichend, **G** = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes. **EHZ** = Erhaltungszustand, **KBR** = kontinentale biogeographische Region, **FV** = günstig (favourable), **U1** = ungünstig – unzureichend (unfavourable – inadequate), **U2** = ungünstig – schlecht (unfavourable – bad), **XX** = unbekannt (unknown). **Arten in Fettdruck** = streng geschützte Art nach BNatSchG.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	RL BY	RL D	EHZ KBR
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	*	<b>3</b>	<b>FV</b>
Breitflügel-Fledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>U1</b>
Fransenfledermaus	<i>Myotis natterii</i>	*	*	<b>FV</b>
Graues Langohr	<i>Plecotus austriacus</i>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>U1</b>
Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	<b>2</b>	*	<b>U1</b>
Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	*	<b>V</b>	<b>U1</b>
Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	*	*	<b>FV</b>
Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	*	*	<b>FV</b>
Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>U1</b>
Mückenfledermaus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	<b>V</b>	*	<b>U1</b>
Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	*	*	<b>U1</b>
Weißrandfledermaus	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	*	*	<b>FV</b>
Zweifarb-Fledermaus	<i>Vespertilio murinus</i>	<b>2</b>	<b>D</b>	<b>XX</b>
Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	*	*	<b>FV</b>

## Betroffenheit der Säugetierarten

### Fledermäuse

**Braunes Langohr (*Plecotus auritus*), Breitflügel-Fledermaus (*Eptesicus serotinus*), Fransenfledermaus (*Myotis natterii*), Graues Langohr (*Plecotus austriacus*), Große Bartfledermaus (*Myotis brandtii*), Großer Abendsegler (*Nyctalus noctula*), Großes Mausohr (*Myotis myotis*), Kleine Bartfledermaus (*Myotis mystacinus*), Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*), Mückenfledermaus (*Pipistrellus pygmaeus*), Rauhautfledermaus (*Pipistrellus nathusii*), Weißbrandfledermaus (*Pipistrellus kuhlii*), Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus*), Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*)**

Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

#### 1 Grundinformationen

Arten im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich

Vorhabenbedingt kommt es bei den Fledermäusen nur zum Verlust von Sommerquartieren durch den Stadel, der abgebrochen wird. Daher werden im Weiteren nur die Fledermausarten mit Sommerquartieren an Gebäuden betrachtet. Ein erheblicher Verlust der Jagdhabitats ist nicht zu prognostizieren. Durch die Bepflanzung der Randbereiche des Geltungsbereiches wird es tendenziell zu einer Verbesserung des Nahrungsangebotes in Folge höherer Insektenmasse kommen.

Nachfolgende Arten zählen zu den „Gebäudefledermäusen“, die potenziell im Vorhabengebiet vorkommen könnten. Die nötigen Informationen zu den einzelnen Arten wurden den Arteninformationen auf der Homepage des Bay. LfU entnommen (<https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/>).

**Braunes Langohr:** Einzeltiere, z. B. einzelne Männchen, nutzen im Sommer sowohl Dachböden als auch Verstecke hinter Außenverkleidungen (Verschalungen, Fensterläden) oder Baumhöhlen und Kästen.

**Breitflügel-Fledermaus:** Die Sommerquartiere von Wochenstuben und Einzeltieren befinden sich in spaltenförmigen Verstecken im Dachbereich von Gebäuden (Wohnhäuser, Kirchen etc.): unter Firstziegeln, hinter Verschalungen, hinter Fensterläden usw.

**Fransenfledermaus:** Für Wochenstuben und Einzelquartiere werden im Wald Baumhöhlen und ersatzweise Fledermaus- oder Vogelnistkästen gewählt, in Ortschaften siedeln Fransenfledermäuse gerne in Hohlblocksteinen von Stallungen oder Maschinenhallen, aber auch in Spalten im Gebälk von Dachböden oder Kirchtürmen.

**Graues Langohr:** Die Sommer- und Wochenstubenquartiere befinden sich in Ortschaften in Gebäuden und dort vor allem in geräumigen Dachstühlen. Beim Grauen Langohr handelt es sich also um eine typische Dorffledermaus, und als Bewohner von Siedlungs- und Ortsrandbereichen gilt sie als klassischer Kulturfolger.

**Große Bartfledermaus:** Wochenstuben- und Sommerquartiere der Großen Bartfledermaus befinden sich in Bayern ganz überwiegend in spaltenförmigen Quartieren an Gebäuden wie unter Verschalungen, in Spalten zwischen Balken, hinter Fassaden oder ähnliches.

**Großer Abendsegler:** Als Sommerquartiere für Wochenstuben, Männchenkolonien und Einzeltiere dienen überwiegend Baumhöhlen (meist Spechthöhlen in Laubbäumen) und ersatzweise Vogelnist- oder Fledermauskästen, aber auch Außenverkleidungen und Spalten an hohen Gebäuden und Felsspalten.

**Großes Mausohr:** Männchen und nicht reproduzierende (jüngere) Weibchen haben ihre Sommerquartiere einzeln in Baumhöhlen, Felsspalten, Dachböden, Gebäudespalten oder Fledermauskästen.

**Kleine Bartfledermaus:** Sie ist hauptsächlich hinter Außenwandverkleidungen und Fensterläden von Wohnhäusern, Garagen und Scheunen zu finden, teilweise auch in Spalten zwischen Giebel und Dachüberstand.

## Fledermäuse

**Braunes Langohr (*Plecotus auritus*), Breitflügel-Fledermaus (*Eptesicus serotinus*), Fransenfledermaus (*Myotis natterii*), Graues Langohr (*Plecotus austriacus*), Große Bartfledermaus (*Myotis brandtii*), Großer Abendsegler (*Nyctalus noctula*), Großes Mausohr (*Myotis myotis*), Kleine Bartfledermaus (*Myotis mystacinus*), Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*), Mückenfledermaus (*Pipistrellus pygmaeus*), Rauhautfledermaus (*Pipistrellus nathusii*), Weißrandfledermaus (*Pipistrellus kuhlii*), Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus*), Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*)**

Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

**Mopsfledermaus:** Sekundäre Quartierstandorte für die Mopsfledermaus können Gebäudespalten in dörflichem Umfeld oder an Einzelgebäuden sein, wo sie hinter Holzverkleidungen, Fensterläden und Brettern an Scheunenwänden Schutz sucht.

**Mückenfledermaus:** Kolonien von Mückenfledermäusen wurden in Spalträumen an Gebäuden wie Fassadenverkleidungen oder hinter Fensterläden gefunden.

**Rauhautfledermaus:** Ersatzweise werden auch Nistkästen oder Spaltenquartiere an Gebäuden besiedelt. Funde in oder an Gebäuden beziehen sich zumeist auf Fassadenverkleidungen, Spalten zwischen Balken und ähnlichem.

**Weißrandfledermaus:** Gebäudequartiere wie Spalten und kleine Hohlräume, Rollladenkästen, Fensterläden oder Räume hinter Dach- und Wandverschalungen.

**Zweifarb-fledermaus:** Als Quartiere für Männchen- wie für Weibchenkolonien dienen typischerweise senkrechte Spalten an Häusern und Scheunen, vor allem hinter Fassadenverkleidungen, überlappenden Brettern und Fensterläden.

**Zwergfledermaus:** Typische Quartiere sind Spaltenquartiere an Gebäuden.

### Lokale Population:

Da keine gezielten Erfassungen durchgeführt wurden, liegen für das Vorhabengebiet sowie das nahe Umfeld des Vorhabengebietes wenige Daten der Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vor. Diese Datensätze weisen unbestimmte Bartfledermäuse (*Myotis mystacinus/brandtii*), Großen Abendsegler (*Nyctalus noctula*), Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*), Rauhaut- oder Weißrandfledermaus (*Pipistrellus nathusii/kuhlii*) und Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*) im Plesser Ried nach. Weitere Daten liegen nicht vor.

Bei den gemeldeten Datensätzen handelt es sich um jagende Tiere, weshalb zum **Erhaltungszustand der lokalen Populationen** keine Aussage getroffen werden kann.

### 2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 5 BNatSchG

Im Vorhabengebiet kommt es projektspezifisch zum Verlust von potenziellen Quartiermöglichkeiten durch den baubedingten Abbruch des Stadels, die den Verlust von Sommerquartieren zur Folge haben können. Im Vorhabengebiet wurden keine gezielten Erfassungen am Gebäude sowie im Allgemeinen durchgeführt, weshalb CEF-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gebäudeabbruch erforderlich sind.

Die durch den Abbruch entfallenden potenziellen Quartiere sind im Vorfeld des Abbruches im räumlich funktionalen Zusammenhang durch Umsetzung von CEF1 auszugleichen bzw. zu ersetzen.

## Fledermäuse

**Braunes Langohr (*Plecotus auritus*), Breitflügel-Fledermaus (*Eptesicus serotinus*), Fransenfledermaus (*Myotis natterii*), Graues Langohr (*Plecotus austriacus*), Große Bartfledermaus (*Myotis brandtii*), Großer Abendsegler (*Nyctalus noctula*), Großes Mausohr (*Myotis myotis*), Kleine Bartfledermaus (*Myotis mystacinus*), Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*), Mückenfledermaus (*Pipistrellus pygmaeus*), Rauhautfledermaus (*Pipistrellus nathusii*), Weißbrandfledermaus (*Pipistrellus kuhlii*), Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus*), Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*)**

Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

Bau- und anlagebedingt werden die potenziellen Nahrungshabitate von Fledermäusen nicht in dem Ausmaß beschädigt oder zerstört, dass hierdurch die ökologische Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Durch die Gehölzpflanzungen ist mit einer Aufwertung der Nahrungshabitate zu rechnen.

Der Verbotstatbestand der Schädigung nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 BNatSchG wird daher nicht erfüllt.

- Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
- CEF-Maßnahmen erforderlich:
- CEF1 Neuschaffung von Spaltenquartieren an Gebäuden als Sommerquartier

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

### 2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Baubedingt wird es vorhabenbedingt zu keinen erheblichen Störungen kommen. Beeinträchtigungen jagender Individuen werden nicht stattfinden, da die Arbeiten nicht in den Dämmerungs- und Nachtzeiten stattfinden und somit keine visuellen Effekte (Licht) oder Immissionen wie Lärm auf die jagenden Fledermäuse einwirken. Anlagen- oder betriebsbedingt werden jagende Fledermäuse ebenfalls keinen erheblichen Störungen ausgesetzt, zumal Gehölzpflanzungen den Lebensraum durch Strukturbereicherung optimieren.

Der Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird somit nicht erfüllt.

- Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
- CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

### 2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG

Durch den Gebäudeabbruch kann es potenziell zu Tötungen oder Verletzungen von einzelnen Individuen kommen, weshalb der Gebäudeabbruch im Zeitraum von 01. November und 28./29. Februar, außerhalb der Quartierzeit und innerhalb der Winterruhezeit von Fledermäusen, stattfinden muss.

Der Verbotstatbestand der Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 wird somit nicht erfüllt.

- Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
- V2 Gebäudeabbruch

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

#### 4.1.2.2 Reptilien

Aus dem Umfeld des Vorhabengebietes liegt gemäß Artenschutzkartierung ein Datensatz zu einer Waldeidechse (*Zootoca vivipara*) vor. Für weitere Reptilienarten, insbesondere streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-RL, fehlen Datensätze. Im Rahmen einer gesonderten Reptilienkartierung in vier Begehungen wurden mit Waldeidechse und Zauneidechse (*Lacerta agilis*) zwei Arten festgestellt. Insgesamt weist das Vorhabengebiet nur sehr wenig geeignete Habitatstrukturen auf und eine konkrete Habitateignung wird nur für die Waldeidechse außerhalb des Vorhabengebietes prognostiziert, weswegen für das Vorkommen der Waldeidechse eine Bodenständigkeit angenommen wird. Für die streng geschützte Zauneidechse wird vermutet, dass es sich bei dem Einzelnachweis um ein wanderndes Individuum gehandelt haben muss. Weitere Nachweise blieben für diese Art aus und im großräumigen Niedermoorkomplex fehlen der Art artspezifisch geeignete und notwendige Lebensstätten. Eine konkrete Habitateignung ist im Vorhabengebiet nicht vorhanden, eine Wirkungsempfindlichkeit ist zudem nicht gegeben. Aufgrund des Fehlens konkreter ganzjähriger Habitateignung im Sinne eines Habitatkomplexes und der einmaligen Beobachtung, die zudem außerhalb des direkten Vorhabenbereiches situiert war, wird ein dauerhaftes Vorkommen der Art im Vorhabengebiet mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen und von einer weiteren Betrachtung der Zauneidechse wird daher abgesehen.

#### 4.1.2.3 Amphibien

Aus dem Vorhabengebiet sind gemäß der Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt keine Vorkommen planungsrelevanter Amphibienarten bekannt. Für Amphibien geeignete Lebensräume wie Tümpel oder Stillgewässer fehlen im gesamten Vorhabengebiet und die wenigen wasserführenden Gräben befinden sich an den Randbereichen des Vorhabengebietes und unterliegen zudem keinen Eingriffen. Ein Gewässerrandstreifen stellt zudem einen Puffer zu den bestehenden Gewässern dar. Die unsystematisch erhobenen Nachweise von nicht auf Artniveau bestimmten „Grünfröschen“ (bzw. unbestimmten Wasserfröschen) befinden sich zudem alle im Bereich der wasserführenden Gräben, in die nicht eingegriffen wird. Unter den „Grünfröschen“ wird auch der als Anhang-IV-Art gelistete Kleine Wasserfrosch (*Pelophylax lessonae*) geführt. Da der gesamte Grünfrosch-Komplex jedoch schwer bestimmbar ist, ist bei Einzelbeobachtungen oder reinen Sicht- oder Rufnachweisen Vorsicht geboten, was die Artbestimmung angeht. Eine sichere Bestimmung gelang nicht. In Anbetracht des Fehlens geeigneter Laichhabitats sowie dem ausbleibenden Eingriff in die wasserführenden Gräben. Hinweise auf Vorkommen des Kleinen Wasserfrosches liegen auch in der Artenschutzkartierung nicht vor, sodass keine weitere Betrachtung der Art durchgeführt wird. Ein Vorkommen weiterer streng geschützter Amphibienarten des Anhang IV der FFH-RL kann anhand der Kenntnisse über die bekannten Vorkommensgebiete, der artspezifischen Verbreitung und dem Fehlen geeigneter Habitate ausgeschlossen werden. Eine explizite Kartierung von Amphibien wurde nicht durchgeführt, da das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG projektspezifisch nicht prognostiziert wird und somit auszuschließen ist. Bau- und anlagebedingt kommt es zudem zu keiner Flächeninanspruchnahme im Bereich der wasserführenden Gräben und Nahrungs- oder essenzielle Teilhabitats werden nicht erheblich beeinträchtigt oder zerstört. Zudem wirken baubedingte Störwirkungen oder Erschütterungen auf die vorkommenden Amphibienarten nur

temporär und zudem sind die Arten wenig empfindlich gegenüber besagten Störquellen. Wanderbeziehungen werden bau-, anlage- oder betriebsbedingt ebenfalls nicht beeinträchtigt. Da die Baufeldfreimachung nicht in die Lebensräume von Fröschen eingreift, ist nicht mit einer Tötung von Individuen zu rechnen.

#### **4.1.2.4 Libellen**

Aus dem Vorhabengebiet sind gemäß der Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt keine Vorkommen planungsrelevanter Libellenarten bekannt. Für Libellen geeignete Lebensräume wie Tümpel oder Stillgewässer fehlen im gesamten Vorhabengebiet und die wenigen wasserführenden Gräben befinden sich an den Randbereichen des Vorhabengebietes und unterliegen zudem keinen Eingriffen. Ein Gewässerrandstreifen stellt zudem einen Puffer zu den bestehenden Gewässern dar. Eine Kartierung von Libellen wurde daher nicht durchgeführt, da das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG projektspezifisch nicht prognostiziert wird und daher auszuschließen ist.

#### **4.1.2.5 Käfer**

Für das Vorhabengebiet liegen gemäß den Daten der Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt keine Daten vor und die landwirtschaftliche Nutzung als auch die Lebensraumausstattung lässt Vorkommen mit Sicherheit ausschließen. Ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ist somit auszuschließen.

#### **4.1.2.6 Tagfalter**

Aus dem Vorhabengebiet sind gemäß der Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt keine Vorkommen planungsrelevanter Tagfalterarten bekannt. Das Vorhabengebiet wird von Intensivgrünland dominiert, wodurch mit keinen planungsrelevanten Tagfalterarten zu rechnen ist. Auch randlich einstrahlende Vorkommen sind nicht bekannt und aufgrund der Habitatstruktur der Säume oder Gräben ausgeschlossen. Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ist daher auszuschließen.

#### 4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:

##### Schädigungsverbot von Lebensstätten (siehe Nr. 2.1 der Formblätter):

**Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.**

**Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).**

##### Störungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblätter):

**Erhebliches Stören von europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.**

**Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).**

##### Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter):

**Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr.**

**Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,**

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das *Tötungs- und Verletzungsrisiko* für Exemplare der betroffenen Arten *nicht signifikant erhöht* und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);
- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).

## **Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten**

Im Frühjahr 2023 wurde eine avifaunistische Kartierung zur Erfassung des gesamten Brutvogelartenspektrums durchgeführt (BÜRO HONOLD 2023), bei der vier Brutvogelarten für das Vorhabengebiet nachgewiesen wurden.

Darunter war mit dem Schwarzmilan eine streng nach BNatSchG geschützte Brutvogelart. Die drei weiteren Arten zählten zu den häufigen und ubiquitären Vogelarten. Auf Grundlage der Kartierung kann von einer vollständigen Erfassung des Brutvogelartenspektrums ausgegangen werden. Nur für die Waldohreule kann ein potenzielles Vorkommen unter den streng geschützten Vogelarten nicht ausgeschlossen werden, eine erhebliche Beeinträchtigung einer lokalen Population kann nicht abgeleitet werden, weshalb die Art keiner weiteren Betrachtung unterzogen wurde.

Unter den Brutvögeln außerhalb des Vorhabengebietes sowie unter den Nahrungsgästen wurden mit Mäusebussard, Rotmilan und Turmfalke drei weitere streng nach BNatSchG geschützte Arten nachgewiesen. Von den im Vorhabengebiet nachgewiesenen Brutvogelarten besitzt keine Art einen Gefährdungsgrad.

In der nachfolgenden saP werden die besonders planungsrelevanten Arten mit Vorkommen im Vorhabengebiet und einer projektspezifischen Wirkungsempfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben behandelt oder, sofern wirkungsempfindlich, werden auch die knapp außerhalb des Vorhabengebietes vorkommenden Arten in die saP miteinbezogen.

Besonders planungsrelevante Arten sind saP-relevante Arten gemäß Bay. LfU, Arten der Roten Listen BY und D inkl. Vorwarnliste, streng geschützte Arten nach BArtSchV, Arten gem. Anhang I VS-RL und lokal seltene Arten. Bei den weit verbreiteten, ubiquitären Arten (sog. „Allerweltsarten“), die im Vorhabengebiet bzw. im Wirkraum vorkommen, ist regelmäßig davon auszugehen, dass durch Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt und, dass für diese Arten keine relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Eine detailliertere Betrachtung dieser Arten wurde daher nicht durchgeführt.

**Tab. 2:** Schutzstatus, Gefährdung und Status der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell vorkommenden saP-relevanten Europäischen Vogelarten, für die eine projektspezifische Wirkung vorliegt.

Erläuterungen zur Tabelle: **RL BY** = Rote Liste Bayern (BAY. LFU 2016), **RL D** = Rote Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020): \* = ungefährdet, **V** = Vorwarnliste, **R** = extrem selten, **3** = gefährdet, **2** = stark gefährdet, **1** = vom Aussterben bedroht, **0** = ausgestorben oder verschollen, **D** = Daten unzureichend, **G** = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes. **EHZ** = Erhaltungszustand, **KBR** = kontinentale biogeographische Region, **FV** = günstig (favourable), **U1** = ungünstig – unzureichend (unfavourable – inadequate), **U2** = ungünstig – schlecht (unfavourable – bad), **XX** = unbekannt (unknown). **Status** = Status im Untersuchungsgebiet, **A** = Brutzeitfeststellung / möglicher Brutvogel, **B** = Brutverdacht / wahrscheinlicher Brutvogel, **C** = Brutnachweis / sicherer Brutvogel, **NG** = Nahrungsgast im Vorhabengebiet, **BVa** = Brutvogel außerhalb des Vorhabengebietes, **PV** = potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommend. **Arten in Fettdruck** = streng geschützte Art nach BNatSchG.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	RL BY	RL D	EHZ KBR	Status
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	3	*	U1	BVa
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	*	*	FV	BVa
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	V	V	FV	BVa
<b>Rotmilan</b>	<b><i>Milvus milvus</i></b>	<b>V</b>	*	<b>FV</b>	BVa
<b>Schwarzmilan</b>	<b><i>Milvus migrans</i></b>	*	*	<b>FV</b>	<b>C</b>
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	V	*	U1	BVa

## Betroffenheit der Vogelart **Schwarzmilan** (*Milvus migrans*)

Europäische Vogelart nach VSRL

### 1 Grundinformationen

Rote-Liste Status Deutschland: \* Bayern: \*

Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich

Status: Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns

günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht

Der Schwarzmilan ist in Bayern regional verbreitet. Die Schwerpunkte der Vorkommen liegen in Unterfranken und auf den Donau-Iller-Lech-Platten bis in den Pfaffenwinkel. Der Bestand in Bayern wird auf etwa 500-650 Brutpaare geschätzt (Rödl et al. 2012).

Die Art besiedelt Waldränder sowie Feldgehölze oder Baumreihen in offener und halboffener Landschaft, gerne in Gewässernähe (Bauer et al. 2012).

#### Lokale Population:

Im Rahmen der Kartierung wurde ein Brutpaar im Nordwesten des Vorhabengebietes festgestellt. Aufgrund der geringen, allenfalls randlich einstrahlenden Gehölzausstattung ist daher allgemein nur mit sehr wenigen Brutpaaren, wohl nur mit einem Brutpaar, zu rechnen. Das weitere Umfeld sowie die Nahrungshabitate stellen einen geeigneten, gut ausgestatteten Lebensraum für die Art dar.

Insgesamt ist der Bestand der lokalen Population als C „mittel-schlecht“ zu bewerten.

Der **Erhaltungszustand** der lokalen Population wird demnach bewertet mit:

hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C)

### 2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Der im Vorhabengebiet befindliche Horstbaum bleibt vom Vorhaben unberührt, da es zu keinen Eingriffen in den Baumbestand oder in Gehölze kommen wird. Bau-, anlage- und betriebsbedingt werden die potenziellen Nahrungshabitate nicht in dem Ausmaß beschädigt oder zerstört, dass hierdurch die ökologische Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.

Der Verbotstatbestand der Schädigung nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 BNatSchG wird nicht erfüllt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

### 2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Durch das Vorhaben kann es baubedingt zu einer erheblichen Störung während der Fortpflanzungszeit im Umfeld des Horstbaumes kommen. Eine erhebliche Störung der Brut kann nicht sicher ausgeschlossen werden, weshalb konfliktvermeidende Maßnahmen für die Teilbereiche des Vorhabensbereichs im Umfeld des Horstbaumes erforderlich werden. Erhebliche Störungen während der Brutzeit des Schwarzmilans werden dadurch ausgeschlossen, dass die Baufeldräumung sowie Erdarbeiten und allgemeine Arbeiten am Vorhaben auf diesen Flurnummern außerhalb der Brutzeit (also nicht zwischen 01. März und 31. Juli) erfolgen. Für die weiteren, nicht explizit genannten Flurnummern des Vorhabensbereichs muss keine jahreszeitliche Einschränkung beachtet werden. Die Arbeiten sind hier jedoch tagsüber durchzuführen.

Der Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird nicht erfüllt.

## Betroffenheit der Vogelart **Schwarzmilan** (*Milvus migrans*)

Europäische Vogelart nach VSRL

- Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
▪ V1 Bauzeitenregelung Schwarzmilan

CEF-Maßnahmen erforderlich:

**Störungsverbot ist erfüllt:**  ja  nein

### 2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG

Eine Tötung oder Verletzung wird dadurch ausgeschlossen, dass die Baufeldräumung und vorhabenbedingte Maßnahmen auf den betroffenen Flurnummern außerhalb der Brutzeit des Schwarzmilans stattfinden (also nicht zwischen 01. März und 31. Juli). Anlagen- und betriebsbedingt ist nicht mit einem erhöhten Tötungsrisiko zu rechnen.

Der Verbotstatbestand der Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird somit nicht erfüllt.

- Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
▪ V1 Bauzeitenregelung Schwarzmilan

**Tötungsverbot ist erfüllt:**  ja  nein

## Betroffenheit der Vogelarten **Gelbspötter** (*Hippolais icterina*), **Goldammer** (*Emberiza citrinella*), **Pirol** (*Oriolus oriolus*), **Rotmilan** (*Milvus milvus*), **Stieglitz** (*Carduelis carduelis*)

Europäische Vogelarten nach VSRL

### 1 Grundinformationen

Arten außerhalb UG  nachgewiesen  potenziell möglich

Status: **Brutvögel außerhalb des Vorhabengebietes**

Vorhabenbedingt kann es bei den nachfolgend aufgeführten Brutvögeln außerhalb des Vorhabengebietes zu Beeinträchtigungen während der Brutzeit kommen.

Die nötigen Informationen zu den einzelnen Arten wurden den Arteninformationen auf der Homepage des Bay. LfU entnommen (<https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/>).

**Gelbspötter:** Gelbspötter brüten in lockeren, sonnigen Laubbeständen mit einzelnen hohen Bäumen und vielen höheren Büschen als Unterwuchs, auch in kleinen Baumgruppen. Feldgehölze, kleine Wäldchen oder sonnige Waldränder, Parkanlagen. Der bayerische Bestand wird auf 6.000-12.000 Brutpaare geschätzt (Rödl et al. 2012).

**Goldammer:** Die Goldammer ist ein Bewohner der offenen, aber reich strukturierten Kulturlandschaft. Ihre Hauptverbreitung hat sie in Wiesen- und Ackerlandschaften, die reich mit Hecken, Büschen und kleinen Feldgehölzen durchsetzt sind, sowie an Waldrändern. Der bayerische Bestand wird auf 495.000-1.250.000 Brutpaare geschätzt (Rödl et al. 2012).

**Pirol:** Pirole besiedeln Laubwälder, größere Feldgehölze, aufgelockerte Waldränder, Flussauen, verwilderte Obstgärten oder Alleen. Der bayerische Bestand wird auf 3.200-5.000 Brutpaare geschätzt (Rödl et al. 2012).

**Rotmilan:** Neststandorte sind vor allem Laubwälder und Mischwälder, vielfach auch Auwälder. Als Nahrungsrevier kommt offenes Land in Betracht, vor allem verschiedene Formen von Grünland, besonders Feuchtgrünland, aber auch Ackerflächen sowie Brachflächen (oft Stilllegungsflächen), Hecken- und Streuobstgebiete. Der bayerische Bestand wird auf 750-900 Brutpaare geschätzt (Rödl et al. 2012).

## Betroffenheit der Vogelarten **Gelbspötter (*Hippolais icterina*)**, **Goldammer (*Emberiza citrinella*)**, **Pirol (*Oriolus oriolus*)**, **Rotmilan (*Milvus milvus*)**, **Stieglitz (*Carduelis carduelis*)**

Europäische Vogelarten nach VSRL

**Stieglitz:** Der Stieglitz besiedelt offene und halboffene Landschaften mit mosaikartigen und abwechslungsreichen Strukturen (u. a. Obstgärten, Feldgehölze, Waldränder, Parks). Entscheidend ist hierbei auch das Vorkommen samentragender Kraut- oder Staudenpflanzen als Nahrungsgrundlage. Der bayerische Bestand wird auf 50.000-135.000 Brutpaare geschätzt (Rödl et al. 2012).

### Lokale Population:

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung wurde bei Gelbspötter, Goldammer, Pirol und Stieglitz je ein Revierpaar und beim Rotmilan ein Brutpaar außerhalb des Vorhabengebietes festgestellt. Alle Arten könnten potenziell aber auch als Brutvögel im Vorhabengebiet vorkommen, wobei geeignete Bruthabitate mehrheitlich außerhalb des Vorhabengebietes situiert sein dürften. Aufgrund der geringen, allenfalls randlich einstrahlenden Gehölzausstattung ist für alle aufgezählten Arten allenfalls mit nur sehr wenigen Brutpaaren/Revieren zu rechnen.

Der Rotmilan jagt dabei im Offenland und nistet in Bäumen, wohingegen die Nahrungshabitate der weiteren hier aufgezählten Arten allesamt in Gebüsch oder Gehölzbeständen liegen.

Für die betroffenen Brutvogelarten außerhalb des Vorhabengebietes liegen keine weiteren Informationen vor, sodass keine Aussagen zum Erhaltungszustand der lokalen Populationen getroffen werden können.

### 2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Die nachgewiesenen oder vermuteten Fortpflanzungsstätten (basierend auf den interpolierten Reviermittelpunkten) der festgestellten Brutvogelarten befinden sich alle außerhalb des Vorhabengebietes. Ein Eingriff in Gehölze (Baufeldfreimachung oder Gehölzrodungen) ist vorhabenbedingt nicht geplant, womit ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 BNatSchG auszuschließen ist.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

### 2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Durch das Vorhaben wird es für den streng geschützten Rotmilan bau-, anlagen- und betriebsbedingt zu keinen erheblichen Störungen während der Fortpflanzungszeit kommen, da dessen Brutplatz etwa 60 m vom Eingriffsbereich entfernt liegt und zudem auf der dem Vorhabensbereich abgewandten Seite befindlich ist. Mit erheblichen Störungen für den Rotmilan ist somit nicht zu rechnen. Die wald- und gebüschbewohnenden Singvögel Gelbspötter, Goldammer, Pirol und Stieglitz sind als relativ unempfindlich gegenüber Störungen einzustufen, weshalb hier nicht mit erheblichen Störungen zu rechnen ist.

Durch die entstehende Kulissenwirkung der Module ist nicht mit einer Beeinträchtigung zu rechnen. Durch die Gehölzanpflanzungen (Hecken) ist mit einer Aufwertung für Gebüsch- und Heckenbrüter zu rechnen.

Für den Rotmilan werden die Nahrungshabitate nicht in solchem Ausmaß verringert, dass eine Beeinträchtigung zu attestieren ist. Durch den Randlinieneffekt und die Strukturbereicherung ist durchaus auch mit einer Verbesserung der Nahrungshabitate zu rechnen. Die ökologische Funktion bleibt im räumlich funktionalen Zusammenhang gewahrt.

Der Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird nicht erfüllt.

**Betroffenheit der Vogelarten Gelbspötter (*Hippolais icterina*), Goldammer (*Emberiza citrinella*), Pirol (*Oriolus oriolus*), Rotmilan (*Milvus milvus*), Stieglitz (*Carduelis carduelis*)**

Europäische Vogelarten nach VSRL

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

**Störungsverbot ist erfüllt:**  ja  nein

**2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG**

Bau-, anlagen- und betriebsbedingt wird der Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfüllt. Die bekannten Horste (Rotmilan) und Revierzentren der planungsrelevanten Brutvogelarten sind alle außerhalb des Vorhabengebietes situiert und die Baufeldräumung bzw. vorhabenbedingten Maßnahmen erfolgen außerhalb der Brutzeit der genannten Arten. Anlagen- und betriebsbedingt ist nicht mit einem erhöhten Tötungsrisiko zu rechnen.

Der Verbotstatbestand der Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird somit nicht erfüllt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

**Tötungsverbot ist erfüllt:**  ja  nein

## 5 Gutachterliches Fazit

Die gutachterliche Einschätzung im Hinblick auf die vorhabenbedingten Maßnahmen kommt hinsichtlich der untersuchten und projektspezifisch relevanten Artengruppen und unter Berücksichtigung der in Kapitel 3 genannten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (=vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) zu dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für europäische Vogelarten nicht erfüllt werden, da

- es zu keiner signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos für einzelne Individuen der untersuchten Artengruppen kommt und der Tötungsverbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt wird,
- erhebliche Störungen streng geschützter Arten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht zu erwarten sind und es zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen kommt
- gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eine dauerhafte Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aufgrund von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen für die Artengruppe Fledermäuse sowie dem Erhalt von Lebensstätten für Vögel auszuschließen ist.

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3 genannten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (=vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) werden keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. Eine Ausnahmeprüfung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist somit nicht erforderlich. Die abschließende Entscheidung obliegt der zuständigen Naturschutzbehörde.

## Literaturverzeichnis

- BAUER, H.-G., FIEDLER, W. & E. BEZZEL (2012): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. – Einbändige Sonderausgabe der 2., vollständig überarbeiteten Auflage 2005. – AULA-Verlag, Wiebelsheim.
- BAY. LFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, 2016): Rote Liste und Liste der Brutvögel Bayerns. Bearbeitung: B.-U. RUDOLPH, J. SCHWANDNER & H.-J. FÜNFSTÜCK. – Augsburg, 30 S.
- BAY. LFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, 2017): Rote Liste und kommentierte Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Bayerns. Bearbeitung: B.-U. RUDOLPH, M. HAMMER, R. KRAFT, M. WÖLFL & A. ZAHN. – Augsburg, 83 S.
- LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE UND ERHOLUNG [LANA] (2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 25 S.
- MEINIG, H., BOYE, P., DÄHNE, M., HUTTERER, R. & J. LANG (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S.
- MKULNV NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. – Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen (Az.: III-4-615.17.03.09). Bearb. FÖA LANDSCHAFTSPLANUNG GMBH (Trier): J. BETTENDORF, R. HEUSER, U. JAHNS-LÜTTMANN, M. KLUBMANN, J. LÜTTMANN, BOSCH & PARTNER GMBH: L. VAUT, KIELER INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE: R. WITTENBERG. Schlussbericht (online).
- RÖDL, T., RUDOLPH, B.-U., GEIERSBERGER, I., WEIXLER, K. & A. GÖRGEN (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern. Verbreitung 2005 bis 2009. – Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 256 S.
- RUNGE, H., SIMON, M. & T. WIDDIG (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. – FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 3507 82 080, (unter Mitarb. von: LOUIS, H. W., REICH, M., BERNOTAT, D., MAYER, F., DOHM, P., KÖSTERMEYER, H., SMIT-VIERGUTZ, J., SZEDER, K.). – Hannover, Marburg.
- RYSLAVY, T., BAUER, H.-G., GERLACH, B., HÜPPOP, O., STAHRER, J., SÜDBECK, P. & C. SUDFELDT (2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 6. Fassung, 30. September 2020. – Berichte zum Vogelschutz 57: 13-112.

## Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Artenlisten. Die in den Arteninformationen<sup>3</sup> des LfU zum Download verfügbaren Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,
- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste

*Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.*

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel sind in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU diejenigen Vogelarten nicht enthalten, die aufgrund ihrer euröken Lebensweise und mangels aktueller Gefährdung in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) einer vereinfachten Betrachtung unterzogen werden können. Bei diesen weit verbreiteten, sog. „Allerweltsvogelarten“ kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass durch Vorhaben keine Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes erfolgt (Regelvermutung).

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmäßig überprüft und ggf. bei neueren Erkenntnissen fortgeschrieben.

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und häufigen Vogelarten von einem Vorhaben betroffen sein können, sind diese Arten ebenfalls als zu prüfende Arten gelistet.

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind.

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste zur Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der ausgefüllten Listen) in den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begründet werden.

<sup>3</sup> <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/>

## **Abschichtungskriterien** (Spalten am Tabellenanfang):

### **Schritt 1: Relevanzprüfung**

**V:** Wirkraum des Vorhabens liegt:

**X** = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)

**0** = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

**L:** Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-  
Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer):

**X** = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  
oder keine Angaben möglich (k.A.)

**0** = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt

**E:** Wirkungsempfindlichkeit der Art:

**X** = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können

**0** = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen  
werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  
weitverbreitete, ungefährdete Arten)

Arten, bei denen *eines* der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.

---

### **Schritt 2: Bestandsaufnahme**

**NW:** Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen

**X** = ja

**0** = nein

**PO:** potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich

**X** = ja

**0** = nein

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.

Arten, bei denen *eines der* o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP zugrunde gelegt.

Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich.

Alle bewerteten Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere werden gem. BAY. LFU (2016) einem einheitlichen System von Gefährdungskategorien zugeordnet:

Die Abkürzungen bedeuten:

**RL BY** = Rote Liste Bayern, **RL D** = Rote Liste Deutschland: \* = ungefährdet, **V** = Vorwarnliste, **R** = extrem selten, **3** = gefährdet, **2** = stark gefährdet, **1** = vom Aussterben bedroht, **0** = ausgestorben oder verschollen, **D** = Daten unzureichend, **G** = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes. **sg** = streng geschützte Art nach BNatSchG.

## A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

### Tierarten:

V	L	E	NW	PO	Artnamen (deutsch)	Artnamen (wiss.)	RL BY	RL D	sg
<b>Fledermäuse</b>									
X	X	X	0	X	Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	3	2	x
0	0	0	0	0	Nordfledermaus	<i>Eptesicus nilssonii</i>	3	3	x
X	X	X	0	X	Breitflügel-Fledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	3	3	x
0	0	0	0	0	Nymphenfledermaus	<i>Myotis alcaethoe</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	3	2	x
X	X	X	0	X	Brandtfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	2	*	x
X	X	0	0	0	Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Wimperfledermaus	<i>Myotis emarginatus</i>	1	2	x
X	X	X	0	X	Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	*	*	x
X	X	X	0	X	Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	*	*	x
X	X	X	0	X	Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	*	*	x
0	0	0	0	X	Kleinabendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	2	D	x
X	X	X	0	X	Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	*	V	x
X	X	X	0	X	Weißbrandfledermaus	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	*	*	x
X	X	X	0	X	Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	*	*	x
X	X	X	0	X	Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	*	*	x
X	X	X	0	X	Mückenfledermaus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	V	*	x
X	X	X	0	X	Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	*	3	x
X	X	X	0	X	Graues Langohr	<i>Plecotus austriacus</i>	2	1	x
0	0	0	0	0	Große Hufeisennase	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	2	2	x
X	X	X	0	X	Zweifelfledermaus	<i>Vespertilio murinus</i>	2	D	x

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
---	---	---	----	----	-------------------	-----------------	-------	------	----

#### Säugetiere ohne Fledermäuse

X	0	0	0	0	Biber	<i>Castor fiber</i>	*	V	x
0	0	0	0	0	Feldhamster	<i>Cricetus cricetus</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Baumschläfer	<i>Dryomys nitedula</i>	1	R	x
X	0	0	0	0	Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	2	3	x
0	0	0	0	0	Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	3	3	x
0	0	0	0	0	Luchs	<i>Lynx lynx</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	*	V	x
0	0	0	0	0	Waldbirkenmaus	<i>Sicista betulina</i>	2	2	x

#### Kriechtiere

0	0	0	0	0	Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	2	3	x
X	X	0	X	0	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	3	V	x
0	0	0	0	0	Östliche Smaragdeidechse	<i>Lacerta viridis</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Mauereidechse	<i>Podarcis muralis</i>	1	V	x
0	0	0	0	0	Äskulapnatter	<i>Zamenis longissimus</i>	2	2	x

#### Lurche

0	0	0	0	0	Geburtshelferkröte	<i>Alytes obstetricans</i>	1	2	x
X	0	0	0	0	Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Wechselkröte	<i>Bufo viridis</i>	1	2	x
X	0	0	0	0	Kreuzkröte	<i>Epidalea calamita</i>	2	2	x
X	0	0	0	0	Europäischer Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	2	3	x
0	0	0	0	0	Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	2	3	x
X	0	0	0	0	Kleiner Wasserfrosch	<i>Pelophylax lessonae</i>	3	G	x
0	0	0	0	0	Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	1	3	x
0	0	0	0	0	Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	V	V	x
0	0	0	0	0	Alpensalamander	<i>Salamandra atra</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Nördlicher Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	2	3	x

#### Fische

0	0	0	0	0	Donau-Kaulbarsch	<i>Gymnocephalus baloni</i>	G	D	x
---	---	---	---	---	------------------	-----------------------------	---	---	---

#### Libellen

0	0	0	0	0	Asiatische Keiljungfer	<i>Gomphus flavipes</i>	3	*	x
0	0	0	0	0	Östliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	1	2	x
0	0	0	0	0	Zierliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	1	3	x
0	0	0	0	0	Große Moosjungfer	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	2	3	x
0	0	0	0	0	Grüne Flussjungfer	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	V	*	x
0	0	0	0	0	Sibirische Winterlibelle	<i>Sympecma paedisca</i>	2	1	x

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
<b>Käfer</b>									
0	0	0	0	0	Schwarzer Grubenlaufkäfer	<i>Carabus variolosus nodulosus</i>	2	1	x
0	0	0	0	0	Großer Eichenbock	<i>Cerambyx cerdo</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Scharlach-Plattkäfer	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	R	1	x
0	0	0	0	0	Breitrand	<i>Dytiscus latissimus</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	<i>Graphoderus bilineatus</i>	0	1	x
0	0	0	0	0	Eremit	<i>Osmoderma eremita</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Alpenbock	<i>Rosalia alpina</i>	2	2	x
<b>Tagfalter</b>									
X	0	0	0	0	Wald-Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha hero</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Moor-Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha oedippus</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Maivogel	<i>Euphydryas maturna</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Gelbringfalter	<i>Lopinga achine</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Großer Feuerfalter	<i>Lycaena dispar</i>	R	3	x
0	0	0	0	0	Blauschillernder Feuerfalter	<i>Lycaena helle</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Apollo	<i>Parnassius apollo</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Schwarzer Apollo	<i>Parnassius mnemosyne</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Thymian-Ameisenbläuling	<i>Phengaris arion</i>	2	3	x
X	0	0	0	0	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Phengaris nausithous</i>	V	V	x
X	0	0	0	0	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Phengaris teleius</i>	2	2	x
<b>Nachtfalter</b>									
0	0	0	0	0	Heckenwollfalter	<i>Eriogaster catax</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Haarstrangwurzeleule	<i>Gortyna borelii</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Nachtkerzenschwärmer	<i>Proserpinus proserpina</i>	V	-	x
<b>Schnecken</b>									
0	0	0	0	0	Zierliche Tellerschnecke	<i>Anisus vorticulus</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Gebänderte Kahnschnecke	<i>Theodoxus transversalis</i>	1	1	x
<b>Muscheln</b>									
X	0	0	0	0	Bachmuschel, Gemeine Flussmuschel	<i>Unio crassus agg.</i>	1	1	x

**Gefäßpflanzen:**

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
0	0	0	0	0	Lilienblättrige Becherglocke	<i>Adenophora liliifolia</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Braungrüner Streifenfarn	<i>Asplenium adulterinum</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Dicke Trespe	<i>Bromus grossus</i>	1	2	x
0	0	0	0	0	Herzlöffel	<i>Caldesia parnassifolia</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Europäischer Frauenschuh	<i>Cypripedium calceolus</i>	3	3	x
0	0	0	0	0	Böhmischer Fransenenzian	<i>Gentianella bohemica</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Sumpf-Siegwurz	<i>Gladiolus palustris</i>	2	2	x
X	0	0	0	0	Kriechende Sellerie	<i>Helosciadium repens</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Sand-Silberscharte	<i>Jurinea cyanoides</i>	1	2	x
0	0	0	0	0	Liegendes Büchsenkraut	<i>Lindernia procumbens</i>	2	2	x
X	0	0	0	0	Sumpf-Glanzkräut	<i>Liparis loeselii</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Froschkraut	<i>Luronium natans</i>	0	2	x
0	0	0	0	0	Bodensee-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis rehsteineri</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Finger-Küchenschelle	<i>Pulsatilla patens</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Sommer-Wendelähre	<i>Spiranthes aestivalis</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Bayerisches Federgras	<i>Stipa pulcherrima ssp. bavarica</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Prächtiger Dünnfarn	<i>Trichomanes speciosum</i>	R	-	x

**B Vögel**

**Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RÖDL et al. 2012) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste**

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
0	0	0	0	0	Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	*	R	-
0	0	0	0	0	Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	*	R	-
0	0	0	0	0	Alpenschneehuhn	<i>Lagopus muta</i>	R	R	-
X	0	0	0	0	Alpensegler	<i>Tachymarptis melba</i>	1	*	-
X	X	X	X	X	Amsel*)	<i>Turdus merula</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	1	1	x
X	X	X	X	X	Bachstelze*)	<i>Motacilla alba</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	R	*	-
X	0	0	0	0	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	*	3	x
X	0	0	0	0	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	2	V	-
X	0	0	0	0	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	V	1	-

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
X	0	0	0	0	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	R	*	x
0	0	0	0	0	Birkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	1	2	x
X	0	0	0	0	Blässhuhn*)	<i>Fulica atra</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	*	*	x
X	X	X	X	X	Blaumeise*)	<i>Cyanistes caeruleus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	2	3	-
0	0	0	0	0	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	R	*	-
X	0	0	0	0	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	1	2	-
X	X	X	X	X	Buchfink*)	<i>Fringilla coelebs</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Buntspecht*)	<i>Dendrocopos major</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	V	*	-
X	X	X	X	X	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	V	*	-
0	0	0	0	0	Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	3	*	x
X	0	0	0	0	Eichelhäher*)	<i>Garrulus glandarius</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	3	*	x
X	0	0	0	0	Elster*)	<i>Pica pica</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	3	3	-
X	0	0	0	0	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	V	2	-
X	0	0	0	0	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	V	V	-
0	0	0	0	0	Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	R	*	x
X	0	0	0	0	Fichtenkreuzschnabel*)	<i>Loxia curvirostra</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	1	3	x
X	X	X	X	X	Fitis*)	<i>Phylloscopus trochilus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	3	V	x
X	0	0	0	0	Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	3	2	x
0	0	0	0	0	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	2	x
X	0	0	0	0	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	*	3	-
X	0	0	0	0	Gartenbaumläufer*)	<i>Certhia brachydactyla</i>	*	*	-
X	X	X	X	X	Gartengrasmücke*)	<i>Sylvia borin</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3	*	-
X	0	0	0	0	Gebirgsstelze*)	<i>Motacilla cinerea</i>	*	*	-
X	X	X	X	X	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	3	*	-
X	0	0	0	0	Gimpel*)	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Girlitz*)	<i>Serinus serinus</i>	*	*	-
X	X	X	X	X	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	*	*	-

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
0	0	0	0	0	Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	1	V	x
X	0	0	0	0	Graugans	<i>Anser anser</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	V	*	-
X	X	X	0	X	Grauschnäpper*)	<i>Muscicapa striata</i>	*	V	-
X	0	0	0	0	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	3	2	x
0	0	0	0	0	Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	1	1	x
X	X	X	X	X	Grünfink*)	<i>Carduelis chloris</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	V	*	x
0	0	0	0	0	Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	R	R	x
0	0	0	0	0	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	3	3	x
0	0	0	0	0	Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	3	2	-
0	0	0	0	0	Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Haubenmeise*)	<i>Parus cristatus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	*	*	-
X	X	X	X	X	Hausrotschwanz*)	<i>Phoenicurus ochruros</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	V	*	-
X	0	0	0	0	Heckenbraunelle*)	<i>Prunella modularis</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	2	V	x
X	0	0	0	0	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	1	V	x
X	0	0	0	0	Kernbeißer*)	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	2	2	x
X	0	0	0	0	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	3	*	-
X	0	0	0	0	Kleiber*)	<i>Sitta europaea</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	V	3	-
0	0	0	0	0	Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	1	1	x
X	X	X	X	X	Kohlmeise*)	<i>Parus major</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Kranich	<i>Grus grus</i>	1	*	x
0	0	0	0	0	Krickente	<i>Anas crecca</i>	3	3	-
X	0	0	0	0	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	V	3	-
0	0	0	0	0	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	1	3	-
0	0	0	0	0	Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	R	R	-

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
X	X	0	0	0	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	3	*	-
X	X	0	X	X	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	*	*	x
X	X	0	0	0	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	3	3	-
X	0	0	0	0	Misteldrossel*)	<i>Turdus viscivorus</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	*	*	x
X	X	X	X	X	Mönchsgrasmücke*)	<i>Sylvia atricapilla</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	R	2	x
X	0	0	0	0	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	V	*	-
0	0	0	0	0	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	1	2	x
X	X	X	X	X	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	V	V	-
0	0	0	0	0	Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>	R	R	x
X	X	X	X	X	Rabenkrähe*)	<i>Corvus corone</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	1	1	x
X	X	0	X	X	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	V	V	-
0	0	0	0	0	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	2	2	-
X	0	0	0	0	Reiherente*)	<i>Aythya fuligula</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Ringeltaube*)	<i>Columba palumbus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Rohrammer*)	<i>Emberiza schoeniclus</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	1	3	x
0	0	0	0	0	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Rotkehlchen*)	<i>Erithacus rubecula</i>	*	*	-
X	X	X	X	X	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	V	*	x
0	0	0	0	0	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	1	2	x
X	0	0	0	0	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	V	*	-
X	0	0	0	0	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	3	*	x
0	0	0	0	0	Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>	R	R	-
X	0	0	0	0	Schwanzmeise*)	<i>Aegithalos caudatus</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	2	3	x
X	0	0	0	0	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	V	*	-

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
0	0	0	0	0	Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthaetus melanocephalus</i>	R	*	-
X	X	X	X	X	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	R	*	
X	0	0	0	0	Singdrossel*)	<i>Turdus philomelos</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Sommergoldhähnchen*)	<i>Regulus ignicapillus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	*	*	x
X	X	X	X	X	Star*)	<i>Sturnus vulgaris</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	R	R	x
0	0	0	0	0	Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	R	R	x
0	0	0	0	0	Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	3	V	x
0	0	0	0	0	Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	1	1	x
0	0	0	0	0	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	1	-
X	X	X	X	X	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	V	*	-
0	0	0	0	0	Stockente*)	<i>Anas platyrhynchos</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	R	*	-
X	0	0	0	0	Sumpfmöwe*)	<i>Poecile palustris</i>	*	*	-
X	X	X	X	X	Sumpfrohrsänger*)	<i>Acrocephalus palustris</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	*	V	-
0	0	0	0	0	Tannenhäher*)	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Tannenmeise*)	<i>Periparus ater</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	*	V	x
X	0	0	0	0	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	V	3	-
0	0	0	0	0	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	1	3	x
X	0	0	0	0	Türkentaube*)	<i>Streptopelia decaocto</i>	*	*	-
X	X	X	X	X	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	2	2	x
0	0	0	0	0	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	1	1	x
X	0	0	0	0	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	V	*	x
X	0	0	0	0	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Wacholderdrossel*)	<i>Turdus pilaris</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	3	V	-
0	0	0	0	0	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	2	1	x
X	0	0	0	0	Waldbaumläufer*)	<i>Certhia familiaris</i>	*	*	-

V	L	E	NW	PO	Artname (deutsch)	Artname (wiss.)	RL BY	RL D	sg
X	0	0	0	0	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2	*	-
X	X	X	0	X	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	*	*	x
0	0	0	0	0	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	*	V	-
0	0	0	0	0	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	R	*	x
X	0	0	0	0	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	*	*	x
X	0	0	0	0	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	*	*	-
X	0	0	0	0	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	3	V	-
X	0	0	0	0	Weidenmeise <sup>*)</sup>	<i>Poecile montanus</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotus</i>	3	2	x
X	0	0	0	0	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	*	V	x
0	0	0	0	0	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	1	3	x
X	0	0	0	0	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	V	V	x
0	0	0	0	0	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	1	3	x
0	0	0	0	0	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	1	2	-
X	0	0	0	0	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	R	2	x
X	0	0	0	0	Wintergoldhähnchen <sup>*)</sup>	<i>Regulus regulus</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Zaunammer	<i>Emberiza cirius</i>	0	3	x
X	0	0	0	0	Zaunkönig <sup>*)</sup>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	1	3	x
X	X	X	0	X	Zilpzalp <sup>*)</sup>	<i>Phylloscopus collybita</i>	*	*	-
0	0	0	0	0	Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	R	1	x
0	0	0	0	0	Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	*	3	x
0	0	0	0	0	Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	1	3	x
0	0	0	0	0	Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	R	R	x
0	0	0	0	0	Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	2	V	x
0	0	0	0	0	Zwergtaucher <sup>*)</sup>	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	*	*	-

<sup>\*)</sup> weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenzulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt.